

ANTIBIOTERAPIA de INFECCIONES OSTEOARTICULARES en PAISES del AREA TROPICAL,

Protocolo elaborado por el Prof. C Strady y el Prof. L. Andreoletti (ambos de Italia).
 Modificado por el Prof. Jose A. Girón (Cádiz, España).

FRANCIA

Duración de la Antibioterapia: Eficacia y eficiencia

-Artritis:


- .Niño: 15 días
- .Adulto: 21 días

-Osteomielitis aguda:

- .Niño: 21 días
- .Adulto: 40 días

-Osteomielitis crónica:

- .Niño: 80 días
- .Adulto: 120 días



Antibioterapia IV NIÑOS:

4-7 días

-Cloxacilina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 75 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 150 mgr/kgr/día, repartido en 4 dosis

o bien

-Cefazolina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 50 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 75 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis

Si Sepsis severa, añadir:

-Gentamicina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 15 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 20 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis

SI ALERGIA: sustituir Cloxacilina o Cefazolina por:

-Clindamicina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 20 mgr/kgr/día, repartido en 4 dosis

más (+)

-Rifampicina ORAL:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria (misma dosis/kgr/día, menores o mayores de 2 kgr)

Antibioterapia IV ADULTOS:

4-7 días

-Cloxacilina:

.2grs. /6 horas

o bien

-Cefazolina:

.2grs./8 horas

Si Sepsis severa, añadir:

-Gentamicina:

.5mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria

Pian (treponema)
 Azitromicina o Penicilina Benzat.

Espontriosis

Itaconatol 3-6 meses
 (hasta 4 semanas después de curación heridas de piel...)
 100 mgr /dz, 1cp después comida

Micetoma (3-6 meses)

Cotrimoxazol que es

Septrim Fnta 960 1cp x 12 Hours
 800/160

En duda de si es

Espontriosis o

Micetoma, añadir

los dos.

FASCIITIS NECRO-SANTE

Cefalosporina + metw-
 midazol

Si por Huesos: Ampic-
 tericina B/IV.

TBC

Buenita 2 meses
 Isoniazida + Rifampicina + Etambutol + Pirazinamida

Africanos: 6 meses, 2 meses más
 Isoniazida + Rifampicina + Etambutol + Pirazinamida

Madagascar
 Isoniazida + Rifampicina + Etambutol + Pirazinamida
 2 meses, luego 4 meses

VER DETRAS

ulcer
 Buruli

Barcelona PDR
 St. Crutty S. PDR
 Betz lactimias
 + clindamicina

SI ALERGIA: sustituir Cloxacilina o Cefazolina por:

-Clindamicina:
.600 mgr/8 horas

o bien

-Levofloxacino:
.750 mgr/día

más(+)

-Rifampicina ORAL:
.600 mgr/día

Antibioterapia ORAL NIÑOS:

-Cefadroxil:
.25-50 mgr/kg/día, repartido en 2 dosis

o bien

-Cefalexina:
.25-50 mgr/kg/día, repartido en 4 dosis

Si ALERGIA:

-Clindamicina:
.30 mgr/kg/día, repartido en 3 dosis

Antibioterapia ORAL ADULTOS:

-Cefadroxil:
.1gr /12 horas

o bien

-Cefalexina:
.500 mgr/6 horas

Si ALERGIA:

-Clindamicina:
.600 mgr/8 horas

o bien

-Levofloxacino:
.500 mgr/día

o bien

-Trimetopin/Sulfametoxazol:
.800/160 mgr/12 horas

Cádiz 14 enero 2013
Fdo. Dr. Julio Rodríguez de la Rúa

Julio Rodríguez