

ANTIBIOTERAPIA de INFECCIONES OSTEOARTICULARES en PAISES del AREA TROPICAL.

Protocolo elaborado por el Prof. C Strady y el Prof. L. Andreoletti (ambos de Italia).
Modificado por el Prof. Jose A. Girón (Cádiz, España).

Duración de la Antibioterapia: Eficacia y eficiencia

-Artritis:

- .Niño: 15 días
- .Adulto: 21 días

-Osteomielitis aguda:

- .Niño: 21 días
- .Adulto: 40 días

-Osteomielitis crónica:

- .Niño: 80 días
- .Adulto: 120 días

Antibioterapia IV NIÑOS:

4-7 días

-Cloxacilina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 75 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 150 mgr/kgr/día, repartido en 4 dosis

o bien

-Cefazolina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 50 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 75 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis

Si Sepsis severa, añadir:

-Gentamicina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 15 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 20 mgr/kgr/día, repartido en 2 dosis

SI ALERGIA: sustituir Cloxacilina o Cefazolina por:

-Clindamicina:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, repartido en 3 dosis
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 20 mgr/kgr/día, repartido en 4 dosis

más (+)

-Rifampicina ORAL:

- .Menores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria
- .Mayores de 2 kgr. de peso: 10 mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria
(misma dosis/kgr/día, menores o mayores de 2 kgr)

Antibioterapia IV ADULTOS:

4-7 días

-Cloxacilina:

.2grs. /6 horas

o bien

-Cefazolina:

.2grs./8 horas

Si Sepsis severa, añadir:

-Gentamicina:

.5mgr/kgr/día, en 1 sola dosis diaria

Pian (treponema)
Azitromicina o Penicilina Benzat.

VER DETRÁS

ulcer
Borrelia

Berclina
St. Crutty S. P. K.
Benzilactamias
clindamicina

Espanticosis

Itaconatol 3-6 mes
(hasta 4 semanas después de curación)
Hendes de piel...
100 mgr /dz, 1cp después comida

Nicotina (3-6 mes)

Cotrimoxazol que es

Sptrim Fnta 960 1cp x 12 Hours
800/160

En duda de si es
Espanticosis o

Nicotina, añadir
los dos.

FASCIITIS NECRO-
SANTÉ

Cefalosporina + metw-
nidazol

Si por Huesos: Ampic-
tericina B/ IV.

TBC

Buenita 2 mes
Isonatide + 1 mes
Rifampicina
Etambutol

African: 6 meses, 2 mes más
Isonatide
Rifampicina

Madagascar
Isonatide
Rifampicina
Etambutol
2 mes, luego 4 mes

SI ALERGIA: sustituir Cloxacilina o Cefazolina por:

-Clindamicina:

.600 mgr/8 horas

o bien

-Levofloxacino:

.750 mgr/día

más(+)

-Rifampicina ORAL:

.600 mgr/día

Antibioterapia ORAL NIÑOS:

-Cefadroxil:

.25-50 mgr/kg/día, repartido en 2 dosis

o bien

-Cefalexina:

.25-50 mgr/kg/día, repartido en 4 dosis

Si ALERGIA:

-Clindamicina:

.30 mgr/kg/día, repartido en 3 dosis

Antibioterapia ORAL ADULTOS:

-Cefadroxil:

.1 gr /12 horas

o bien

-Cefalexina:

.500 mgr/6 horas

Si ALERGIA:

-Clindamicina:

.600 mgr/8 horas

o bien

-Levofloxacino:

.500 mgr/día

o bien

-Trimetopin/Sulfametoxazol:

.800/160 mgr/12 horas

Cádiz 14 enero 2013

Fdo. Dr. Julio Rodríguez de la Rúa

Julio Rodríguez