

CUIDADOS DEL RN A BORDO DE UN BUQUE DE LA ARMADA




Parto de una refugiada abordo de un barco de Médicos Sin Fronteras (Mediterráneo, costas de Libia, 20/10/2015)

Col. Médico Juan M. García-Cubillana de la Cruz
Base Naval de Rota, 12 enero 2016





Contacto madre hijo, abrigarlo y ponerlo al pecho



Ligadura natural, oportuna o tardía: cuando han cesado las pulsaciones(1-3 minutos tras nacimiento). Pinza Kocher a 2-3 cm del ombligo y una segunda a 3 cm del extremo placentario del cordón.



Aspiración suave, boca-nariz, secar, abrigar

TEST DE APGAR

| Puntuación/ Parámetro | 0 | 1 | 2 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Coloración piel | Azul o pálido | Cuerpo rosado y extremidades azuladas | Cuerpo totalmente rosado |
| Frecuencia Cardíaca | Ausencia de latido | Menos de 100 latidos por minuto | Más de 100 latidos por minuto |
| Respiración | Ausente | Lenta e irregular | Buena con llanto |
| Tono Muscular | Flácido | Extremidades ligeramente flexionadas | Movimiento activo |
| Irritabilidad Refleja | Sin Respuesta | Se queja o hace muecas | Llanto, tos, estornudos, movimiento |



1, 5 y 10 minutos

| RESULTADOS DE LAS PUNTOACIONES ANTERIORES | |
|---|--|
| 8 A 10 | Bebé en buenas condiciones |
| 4 A 6 | El Neonato requiere valoración clínica y recuperación inmediata. |
| Inferior a 4 | Atención de emergencia con medicamentos intravenosos y respiración asistida. |



Limpieza ocular con suero fisiológico estéril



Administración de 1 gramo de Oftalmolosa Cusí Aureomicina 5 mg/g pomada oftálmica



Vitamina K: 1 mg IM dosis única (Konakion 2 mg/0.2 ml pediátrico solución oral/inyectable)







Cuidados del cordón umbilical: clorhexidina, alcohol 70º *versus* abstención.



Lavado del RN: opcional, no necesario. No obsesionarse con retirar el *caseum*



Postura back to sleep o back to bed







Cara Sucia (Acajutla) El Salvador, 1998



Banda Aceh (Sumatra) Indonesia, 2005



Cap. Enfermero Ángel Ruiz Muriel

Mozambique, 1999



OTROS POSIBLES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A BORDO

- Temperatura rectal, saturación de oxígeno
- Glucemia capilar (4, 8, 12, 24 y 48 h). Hipoglucemia: < 25-35 mg/dl RN pre-término y < 35-45 mg/dl RN a término (primeras 24 h)
- Sondaje nasogástrico y rectal (6-8 french)
- Hemograma y PCR capilares (bolsa rota > 12-18 horas)





Aguas de Libia (Sabratah)
Recogida de 517 Migrantes
04NOV2015

Tcol Médico A. Carabot
FFG Canarias - 2015

FFG Canarias
EUNAVFOR MED LIBYA
OPERACIÓN SOPHIA 1ª ROTACION
01OCT2015 a 28ENE2016

TCOL MEDICO A. CARABOT RGUEZ-RUBIO
TTE ENFERMERO ANTONIO J MACHADO



Enfermería de FFG Canarias

TCOL MEDICO A. CARABOT RGUEZ-RUBIO
TTE ENFERMERO ANTONIO J MACHADO